

Dipartimento Medicina Generale, Lungodegenza, Riabilitazione, Specialità Mediche
U.O.S.D. Recupero e Riabilitazione
P.O. Nocera: Dott.ssa M. Gambacorta
P.O. Oliveto Citra: Dott. S. Rufolo
P.O. Polla: Dott.ssa A. Paolino
P.O. Vallo Della Lucania: Dott.ssa L. Guida

ALLEGATO N. 5

Paziente **data di nascita**

Bedside Swallow Assessment		
Livello di coscienza	Vigile	1
	Soporoso risvegliabile	2
	Non apre gli occhi ma risponde agli stimoli verbali	3
	Risponde agli stimoli dolorosi	4
Controllo del tronco e della testa	Tronco normale	1
	Posizione del tronco non mantenuta	2
	Controllo solo testa	3
	Non controllo testa	4
Respirazione	Normale	1
	Patologica	2
Chiusura delle labbra	Normale	1
	Patologica	2
Movimento del palato	Simmetrici	1
	Asimmetrici	2
	Minimi/assenti	3
Funzione laringea (aaah/ee)	Normale	1
	Ridotta	2
	Assente	3
Riflesso della deglutizione	Presente	1
	Assente	2
Riflesso della tosse	Normale	1
	Ridotto	2
	Assente	3
Stadio 1: assunzione di 5 ml di acqua in un cucchiaino, per 3 volte		
Rifiuta l'acqua	Mai o una volta	1
	Più volte	2
Movimenti laringei con tentativi di deglutizione	Si	1
	No	2
Movimenti ripetitivi	Mai o una volta	1
	Più volte	2
Tosse durante la deglutizione	Mai o una volta	1
	Più volte	2
Stadio 2: la deglutizione è normale nello stadio 1, si somministrano 60 ml di acqua in 1 bicchiere		
E' in grado di terminare	Si	1
	No	2
Tempo necessario per terminare in secondi		
Numero di sorsi necessari		

Dipartimento Medicina Generale, Lungodegenza, Riabilitazione, Specialità Mediche
 U.O.S.D. Recupero e Riabilitazione
 P.O. Nocera: Dott.ssa M. Gambacorta
 P.O. Oliveto Citra: Dott. S. Rufolo
 P.O. Polla: Dott.ssa A. Paolino
 P.O. Vallo Della Lucania: Dott.ssa L. Guida

Tosse durante o dopo la deglutizione	No	1
	Si	2
Gorgoglio durante o dopo la deglutizione	No	1
	Si	2
Funzione laringea dopo la deglutizione	Normale	1
	Disfonia	2
	Afonia	3
Sensazione di aspirazione	No	1
	Possibile	2
	Si	3
Punteggio totale		

Punteggio pari o superiore a 24: grave disfagia con indicazione a nutrizione artificiale
Punteggio inferiore a 24 consente di intraprendere la nutrizione orale.